

# KARTA PACJENTA

## ***Rivaroxaban LEK-AM*** ***20 mg***

**Jestem poddawany(-a) leczeniu  
przeciwwzakrzepowemu lekiem  
Rivaroxaban LEK-AM  
(rywaroksaban).**

**Kartę należy zawsze mieć  
przy sobie.**



**Kartę należy okazać  
przed leczeniem każdemu  
lekarzowi lub dentyście.**

Imię i nazwisko:

.....  
.....

Adres: .....

.....  
.....

Data urodzenia: .....

Masa ciała: .....

Inne leki/choroby: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**W nagłym przypadku należy powiadomić:**

Imię i nazwisko lekarza:

.....  
.....

Telefon lekarza: .....

Pieczętka lekarza:

**Należy również powiadomić:**

Imię i nazwisko:

.....  
.....

Telefon: .....

Pokrewieństwo: .....

### Informacja dla lekarza

- Wskaźnik INR nie jest właściwy do pomiaru aktywności przeciwzakrzepowej leku Rivaroxaban LEK-AM i z tego powodu INR nie może służyć do monitorowania leczenia Rivaroxaban LEK-AM.

### Co należy wiedzieć o leku Rivaroxaban LEK-AM?

- Lek Rivaroxaban LEK-AM rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Rivaroxaban LEK-AM należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi,

#### **nigdy nie należy pomijać dawki.**

- Nie przerywać podawania/przyjmowania leku Rivaroxaban LEK-AM bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Rivaroxaban LEK-AM należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje lek Rivaroxaban LEK-AM przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

### Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Rivaroxaban LEK-AM, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych.

Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym.

Nie rozpoczynać przyjmowania leku Rivaroxaban LEK-AM bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli wiadomo, że pacjent jest w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe krwawienia, takie jak wymienione poniżej:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi czas,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z pochwy o większym nasileniu niż normalnie,
- krew w moczu która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

### Jak przyjmować lek Rivaroxaban LEK-AM ?

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Rivaroxaban LEK-AM:

- 10 mg tabletki można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia,
- 15 mg tabletki trzeba przyjmować z jedzeniem,
- 20 mg tabletki trzeba przyjmować z jedzeniem.